2023.11.21

DI ニュース No.566

《薬品の新規採用のお知らせ》

以下の薬品の採用についてお知らせ致します。

代謝賦活剤

ＡＴＰ注 10 mg「イセイ」

（薬価：51.00 円/管）

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
脳出血直後の患者［脳血管拡張により再出血するおそれがあるもの

【効能・効果】
下記疾患に伴う諸症状の改善（頭部外傷後遺症）

心不全、筋ジストロフィー症及びその類縁疾患、急性灰白髄炎、脳性小児麻痺（弛緩型）、進行性脊髄性筋萎縮症及びその類似疾患、調節性眼精疲労における調節機能の安定化、耳鳴・難聴、消化管機能低下のみられる慢性胃炎、慢性肝疾患における肝機能の改善

【用法・用量】
（静脈内注射）
通常 1 回 5～40mg を 1 日 1～2 回、等張ないし高張ブドウ糖注射液に溶解して、徐々に静脈内注射する。

（点滴静脈内注射）
通常 1 回 40～80mg を 1 日 1 回、5%ブドウ糖注射液 200～500mL に溶解し、30～60 分かけて点滴静脈内注射する。

（筋肉内又は皮下注射）
通常 1 回 5～40mg を 1 日 1～2 回筋肉内又は皮下注射する。

11 月 21 日よりオーダー可能です。
ご確認よろしくお願い致します。

薬剤科　内線（2411）